

A FEKETEBERKENYE TÁPANYAGIGÉNYE

Ahogy más gyümölcsfajoknál, itt is eléggé eltérő javaslatokat lehet olvasni. Egységes ajánlatot nem is lehet adni, mert a növény által felhasznált (kivonási érték) mennyiségen felül még sok tényező befolyásolja a kiadandó tápanyagok mennyiségét.

Befolyásoló tényezők:

- a telepítési rendszer
- az ültetvény kora
- a fajta sajátos igénye
- a talaj minősége
- a vízellátás (csapadék, öntözés, talajvízszint magassága)
- a talajművelés módja
- a hőmérséklet változásai a tenyészidőben
- a trágya kijuttatásának módja
- a trágya fizikai, kémiai tulajdonságai

Ezért el kell fogadni azt, hogy a közölt adatok az adott helyen jók, hogy melyiket vesszük alapul saját használatunkra, azt a gazdának kell eldöntenie a befolyásoló tényezők alapján.

Az egy növényre ajánlott tápanyagmennyiségek feketeberkenye ültetvényben

Forrás	Gramm tápanyag egy növényre		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Ismeretlen szerző	4,7	11,4	33,2
Jeppson (Svédország)	6-10	7-15	17-52
H.Rousseau (IRDA)	5-20	2-10	4-20
Saint-Bonaventure (Ca)	2,2	12,3	18,9
Clément-Mathieu (Ca)	2,3	5,4	15,6

A számok a trágyában található hatóanyag mennyiségét mutatják, nem a trágya mennyiségét.

A különböző számokból azért kiolvasható, hogy az aronia erősen káliumigényes, nitrogénigénye viszont elég alacsony, ami nem meglepő a lassú növekedése miatt. A foszforból közepesnek mondható átlag számítható ki, de figyelembe kell venni, hogy a foszfor hatása jó ellátottságnál, de nagy hiánynál is lassan jelenik meg.

<http://www.aronia-hu.hu/>